44

Vass7R02s426-430

1538Mtp3


top se sue so

Laureiro 10 R72-356-360











ANNEE: 1993 220 NOM Laureiro - Loureiro EMPLACEMENT 10 R70.356.360 Dt 1.87. 1538 03 ouche Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Maturité 7 25,3 29,32 0 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill: 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 3 183 El.3× 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANNEE: 1994

220

NOM Laureiro = Laureiro EMPLACEMENT 10 R7 1356.360

1538 03

1538.03.													
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturit é			
2 }	h	73	10.3	6	12	22,5	26,5	30.5	1,8	4.8	8.8	12,3	
3 1 3			73×	1	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: O Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Wyl Vigueur: Y								

A.		1395 vereiro 8.03			EMPLACEMENT NO R7 A 356. 360							
Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti- lité				Véraison début mi/v fin		fin	Maturit é
1 2 % 3 % 4 %	3	6,3	13.3.	0								

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Laureiro 10 R7s-356,360 s.1

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/8 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 28 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 92

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Laureiro 10 R70-356,360 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250,

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259,

: verte 260 / jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265.) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 93

N° d'ordre :

Désignation :

Laureiro 10 R70. 356-360 Ac 1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - ccurt 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 91

Eaureiro N° d'ordre

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Désignation :

10 R70-356,360 A 11 Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 44 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73 A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions : 15 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation faqile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 / court 121) A pédicelle de couleur : verte 122 / rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (129. A pinceau : court 130 - moyen 181) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134) A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

_Calvo 92

Laureiro

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

10 R70.356,360A,1

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

Surface

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

- Calvo 92

```
d'ordre : Loureuro
od'ordre:
implacement : 10 R7 A356,360
                                 : 1 - 2 - 3
ingle des nervures
sexe
                                 : (7)-8-9
11/1.
                                 : 10 - (11)
12/L
                                 : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
                                 : (267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                  : (40) - 41
 Dents : forme
                                  : (42) - 43 - 44
 Dents (angle)
                                  : 45 - (46) - (47)
 Angle du lobe terminal
 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                          : 60 - 61 - 62
 Angle des nervures L3 L'3
                                  : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
 Dent terminale du lobe latéral supérieur
 Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
 Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
```

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 93